




Alles wat u
moet weten over
hysterosalpingografie
(HSG)



Probeert u tevergeefs **zwanger** te worden?

Als uw huisarts u doorstuurt naar de gynaecoloog voor vruchtbaarheidsonderzoeken, wordt er soms een baarmoederfoto gemaakt. Dit heet een hysterosalpingografie of kortweg een HSG.



Wat is een **HSG**?

Een HSG is een onderzoek om te bekijken of uw eileiders doorgankelijk zijn en of de baarmoederholte er normaal uitziet. Er worden röntgenbeelden gemaakt terwijl een contrastvloeistof langzaam in uw baarmoeder en eileiders wordt gespoten.




✔ **Waarom wordt naar de eileiders gekeken?**

Bij verstoppingen in de eileiders kunnen de zaadcellen niet bij de eicel komen. Er kan dus geen bevruchting optreden (zie figuur 1) . Minstens één open eileider is nodig voor bevruchting.

✔ **Waarom wordt naar de baarmoederholte gekeken?**

In de baarmoeder kunnen bijvoorbeeld poliepen, vleesbomen en verklevingen voorkomen. Ook kan de baarmoeder een afwijkende vorm hebben. Dit kan een zwangerschap mogelijk bemoeilijken.

AFBEELDING 1 - DE REIS VAN DE ZAADCELLEN NAAR DE EICEL & DE BEVRUCHTING




Wat is de contrastvloeistof die bij een HSG gebruikt wordt?

De contrastvloeistof bij een HSG is een heldere vloeistof op basis van jodium die zichtbaar wordt op röntgenbeelden. Hiermee worden de baarmoeder en eileiders in beeld gebracht. Er zijn twee soorten contrastvloeistof die gebruikt kunnen worden: op oliebasis of op waterbasis. Vraag uw arts om nadere informatie over deze contrastvloeistoffen.


Kan een HSG me helpen om zwanger te worden?

Bij wetenschappelijk onderzoek werd gevonden dat er bij bepaalde groepen vrouwen een grotere kans op zwangerschap is na een HSG.



Wanneer wordt een HSG gedaan?

Een HSG wordt ná uw menstruatie en voor de eisprong uitgevoerd (bij vrouwen met een regelmatige cyclus van 28 dagen het best vóór de 12e dag van de menstruatiecyclus).



Het geplande moment voorkomt dat u zwanger kunt zijn terwijl u de HSG krijgt. Uw arts kan u ook vragen om geen seksuele gemeenschap te hebben vanaf de eerste dag van de menstruatie tot de dag van de HSG en/of de arts kan een zwangerschapstest doen voordat de HSG gedaan wordt.

Wat gebeurt er tijdens een HSG?

VOORBEREIDING


- ✓ U gaat op de röntgentafel liggen met gebogen knieën
- ✓ Er wordt voorzichtig een speculum ingebracht
- ✓ De baarmoedermond wordt schoongemaakt
- i** In de meeste gevallen wordt geen verdoving gebruikt.



DE HSG PROCEDURE



Het onderzoek duurt meestal korter dan 15 minuten. Houd rekening met in totaal ongeveer **30 minuten** inclusief de voorbereidingstijd.



- 1 Een dun plastic slangetje (ofwel katheter) gaat door de baarmoedermond
 - 2 De contrastvloeistof wordt langzaam door het buisje in de baarmoeder gespoten
 - 3 De voortgang van de contrastvloeistof wordt gevolgd met het röntgenapparaat en er worden röntgenfoto's gemaakt
 - 4 De instrumenten worden voorzichtig verwijderd
- i** Soms wordt u gevraagd om nog 30 minuten te wachten op de afdeling radiologie om nog een extra röntgenfoto te maken (zonder dat opnieuw contrastvloeistof wordt ingespoten).

Veel gestelde vragen

WAT ZIJN CONTRA-INDICATIES VOOR EEN HSG?

Een HSG mag niet worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap of als u een acute ontsteking in het bekkengebied hebt. Het onderzoek kan ook beter niet plaatsvinden als u recent een (interne) bloeding, een operatie in het bekkengebied of traumatische verwondingen hebt gehad. Ook hyperthyreoïdie (te snel werkende schildklier) is een contra-indicatie. Vertel het uw arts als u eerder een allergische reactie op jodiumhoudende contrastvloeistof hebt gehad.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN HSG?

Een HSG is een eenvoudige, niet ingrijpende procedure die nuttige informatie oplevert over de baarmoederholte en eileiders. De resultaten van het onderzoek, gecombineerd met de andere vruchtbaarheidsonderzoeken die u krijgt, helpen uw dokter om de beste behandelmogelijkheden voor te stellen. In sommige gevallen kan een HSG de kans op zwangerschap (tijdelijk) verhogen (zie pagina 3).



HOE MOET IK ME VOORBEREIDEN?

Vertel uw arts over uw andere gezondheidsproblemen, recente ontstekingen in het bekkengebied en over alle medicijnen die u op dit moment gebruikt. Misschien wordt u getest op infecties zoals Chlamydia. Soms krijgt u antibiotica voorgeschreven om voor of na het onderzoek te gebruiken.



WAT ZAL IK TIJDENS EN NA HET ONDERZOEK ERVAREN?

U kunt tijdens de HSG wat menstruatie-achtig ongemak en krampen voelen. Als het ongemak na het onderzoek aanhoudt, kan dit worden verlicht door eenvoudige pijnstilling. Na het onderzoek kunt u een lichte vaginale bloeding krijgen en er kan contrastvloeistof, een kleverige heldere vloeistof, uit de vagina lopen. Daarom raden we u aan een maandverband te gebruiken. Elk ongemak of licht bloedverlies zou binnen een tot twee dagen moeten verdwijnen.

ZIJN ER BIJVERSCHIJNSELEN?

Een HSG verloopt over het algemeen goed, maar af en toe kunnen er bijwerkingen optreden. De meest voorkomende bijwerkingen zijn ontsteking, pijn, flauwvallen en allergie voor de contrastvloeistof. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u zich zorgen maakt of als u koorts, onaangename afscheiding, aanhoudende pijn of aanhoudende bloeding ervaart.

HOE ZIT HET MET STRALING?

De hoeveelheid straling van een HSG is erg laag (meestal minder dan een röntgenfoto van de borstkas), van de blootstelling is niet aangetoond dat het schade toebrengt. Na het onderzoek blijft er geen straling in uw lichaam achter.



Deze brochure is aan u verstrekt door:

Bezoek onze website voor
meer informatie

hysterosalpingography.guerbet.com | 🔍

